

# La syphilis

Si vous recherchez des informations en d'autres langues, consultez le site : [www.hivportalen.se](http://www.hivportalen.se)

La syphilis est causée par une bactérie. Cette bactérie peut se fixer dans la muqueuse des organes génitaux, mais aussi dans le rectum, dans la bouche ou dans la gorge. La bactérie peut également se trouver dans des plaies ou des éruptions cutanées causées par la bactérie elle-même. La syphilis est contractée lors de rapports sexuels non protégés et elle est facilement transmise entre les partenaires par rapports vaginaux, anaux ou buccaux. La syphilis peut se transmettre par la salive. La bactérie pénètre alors les plaies ou les lésions de la muqueuse buccale. Vous pouvez également contracter la syphilis par le sang si vous prenez de la drogue et que vous utilisez les seringues et les aiguilles d'une personne porteuse de la bactérie.

## SYMPTÔMES DE LA SYPHILIS

La syphilis ne donne pas toujours de symptômes. Il peut aussi s'écouler un certain temps avant que des symptômes n'apparaissent. Si vous avez des symptômes, ils apparaissent entre deux semaines environ et jusqu'à trois mois après la contamination. Vous pouvez alors avoir des plaies sur les organes génitaux ou aux endroits par lesquels la bactérie est entrée, par exemple autour de l'orifice anal ou dans la bouche. Ces plaies ne sont pas toujours douloureuses. Les glandes lymphatiques situées à proximité de la plaie sont souvent enflées.

## TESTEZ-VOUS POUR LA SYPHILIS

Le prélèvement concernant la syphilis est gratuit. Le test consiste en une prise de sang. On peut également faire un prélèvement sur la plaie où l'on pense que la bactérie se trouve. Cette bactérie ne peut se révéler au plus tôt que quatre semaines après la contamination. C'est pourquoi il faut attendre trois mois après la contamination avant de faire le test, pour être sûr que la bactérie soit découverte. Faites le test si vous soupçonnez que vous avez contracté la syphilis.

## TRAITEMENT

Le traitement de la syphilis est gratuit. Il s'agit habituellement d'injections de pénicilline pendant une à trois semaines. Si vous avez contracté la syphilis, votre partenaire sexuel doit aussi faire le test et suivre un traitement. Si vous avez plusieurs partenaires sexuels, tous doivent faire le test.

## PENSEZ-Y EN CAS DE SYPHILIS

Vous pouvez contracter la syphilis plusieurs fois. Les plaies syphilitiques peuvent guérir d'elles-mêmes et l'infection peut rester latente dans votre corps pendant de nombreuses années. Vous risquez aussi certaines séquelles si elle n'est pas traitée. Le risque de séquelles diminue si vous vous faites traiter rapidement.

La syphilis peut revenir en stades d'infection secondaire ou tertiaire. Les symptômes diffèrent alors du premier stade. Lors de la syphilis du stade secondaire, vous pouvez avoir par exemple sur le corps des éruptions qui écaillent, de la fièvre et des chutes de cheveux. Le stade tertiaire, beaucoup plus tard, peut causer de graves lésions cardiovasculaires. La peau et les muqueuses peuvent aussi être atteintes, tout comme le système nerveux et le cerveau. Les lésions vasculaires, neurologiques et cérébrales peuvent être mortelles si l'on ne se fait pas traiter.

Sans traitement, la syphilis peut se transmettre à l'enfant pendant la grossesse et lui causer de graves lésions. Les femmes enceintes se voient parfois proposer un test de syphilis. Son objet est de permettre à la mère de suivre un traitement et de protéger son enfant des lésions.

---

Ces textes ont été produits en 2009 par la Direction nationale suédoise de la santé et des affaires sociales et vérifiés par HANS CARLBERG, médecin chef de Sösam, Unité de santé sexuelle de la Clinique de dermatologie et de vénérologie, Centre Hospitalier Södersjukhuset; HANS FREDLUND, chercheur et spécialiste en prévention des maladies infectieuses à l'Administration de la Santé «Landsting» de la Région d'Örebro, Centre Hospitalier Universitaire d'Örebro; LENA MARIONS, chercheur et médecin-chef à la clinique spécialisée en Médecine de la femme du Centre Hospitalier Universitaire Karolinska.

---

Forme graphique et illustrations: Infab

