

Гонорея/Gonorrhé

Вы ищете информацию на других языках? Посетите сайт www.hivportalen.se

Возбудителем гонореи является бактерия, чаще всего поселяющаяся в мочеиспускательном канале. Бактерии также могут присутствовать в глотке или прямой кишке как у женщин, так и у мужчин. У женщин бактерии могут находиться на слизистой влагалища.

Гонорея распространяется при незащищённом вагинальном и анальном сексе. Бактерии также могут передаваться при незащищённом оральном сексе. Хотя это и необычно, гонорея может передаваться при взаимной мастурбации посредством прямого контакта с инфицированной слизистой оболочкой. Достаточно, чтобы пальцы оказались в прямом контакте с инфицированной слизистой оболочкой – после чего они инфицируют здоровую слизистую. Гонорея также может передаваться, если Вы пользуетесь общими секс-игрушками с кем-либо.

СИМПТОМЫ ПРИ ГОНОРЕЕ

Гонорея легко передаётся и необязательно вызывает какие-либо симптомы. Не имея симптомов, Вы можете передать инфекцию Вашему половому партнёру. Точно так же, не подозревая об этом, Вы можете заразиться гонореей от своего партнёра. С момента инфицирования до появления симптомов обычно проходит от двух до семи дней. Симптомы чаще всего проявляются в виде выделений из мочеиспускательного канала, и возможно жжение при мочеиспускании. Если инфекция находится в горле или прямой кишке, симптомы могут быть лёгкими или же вовсе остаться незамеченными.

АНАЛИЗ НА ГОНОРЕЮ

Анализ на гонорею делается бесплатно. Для обнаружения инфекции, берут анализ на бактерии из мочеиспускательного канала. У женщин также берут анализ с шейки матки. Если Вы занимались незащищённым оральным или анальным сексом, следует сдать анализы из глотки и прямой кишки.

Проверьтесь, если Вы подозреваете, что заразились гонореей. Однако может пройти несколько дней, вплоть до одной недели, с момента инфицирования, прежде чем анализы покажут гонорею. Поэтому прежде чем идти проверяться, стоит подождать несколько дней после того, как Вы занимались незащищённым сексом.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение от гонореи бесплатно, инфекцию лечат антибиотиками. Во время лечения важно воздержаться от секса. Кроме того, прежде чем вновь вступить в половые отношения после завершения лечения, Вы должны сдать ещё один анализ, чтобы проверить, что бактерии больше нет. Дело в том, что порой бактерия имеет высокую сопротивляемость и тяжело излечима. В таком случае, Вам может понадобиться другой тип антибиотиков. Ваш половой партнёр также должен сдать анализы. Если у Вас несколько партнёров, то все они должны пройти обследование и в случае, если они инфицированы, пройти лечение.

ПРИ ГОНОРЕЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

Гонореей можно заразиться повторно. Если инфекцию не лечить, она может повлечь за собой осложнения. Риск последующих осложнений уменьшается, если лечение начнется незамедлительно. У женщин может возникнуть воспаление в фаллопиевых трубах. У мужчин может начаться воспаление придатков яичников. Невылеченная гонорея влияет на возможность иметь детей – она ведет к бесплодию. Бактерия также может попасть в кровь и вызвать заражение крови.

Данные тексты составлены в 2009 г. Государственным управлением здравоохранения и социального обеспечения. Редакторы: Ханс Карлберг, главный врач SöSAM, Отделение сексуального здоровья кожно-венерологического диспансера при больнице SÖDERSJUKHUSET; Ханс Фредлунд, доцент и врач-эпидемиолог Университетской больницы в ÖREBRO в областном управлении района (LÄN) ÖREBRO; Лена Марионс, доцент и главный врач Женской клиники при Каролинской Университетской больнице (KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET).

Художественное оформление и иллюстрации: Infab AB

