

Сифилис/Syphilis

Вы ищете информацию на других языках? Посетите сайт www.hivportalen.se

Возбудителем сифилиса является бактерия. Бактерия может находиться на слизистой оболочке половых органов, но также и в прямой кишке, во рту или глотке. Бактерия также может присутствовать в язвах или высыпаниях на коже, вызываемых бактериями. Сифилис распространяется при незащищённых половых контактах и легко передаётся между людьми при вагинальном, анальном и оральном сексе. Сифилис может передаваться со слюной. Тогда бактерии проникают в язвы или повреждения слизистой оболочки ротовой полости. Сифилисом также можно заразиться через кровь, если, принимая наркотики, пользоваться одним и тем же шприцем и иглой с носителем бактерии.

СИМПТОМЫ ПРИ СИФИЛИСЕ

При сифилисе не всегда возникают симптомы. Может пройти длительное время, прежде чем Вы ощутите какие-либо проблемы. Если симптомы возникают, то они проявляются примерно через срок от двух недель до трёх месяцев после того, как Вы заразились инфекцией. Тогда могут образоваться язвы на половых органах или в местах проникновения бактерий, например, вокруг анального отверстия или в ротовой полости. Язвы необязательно вызывают ощущение жжения или причиняют боль. Лимфатические узлы рядом с язвой часто опухают.

ПРОВЕРЬТЕСЬ НА СИФИЛИС

Анализ на сифилис делается бесплатно. Чтобы проверить, надо сдать анализ крови. Анализ также могут взять из раны, где, как можно предположить, имеется бактерия. Бактерии могут быть обнаружены самое раннее через четыре недели после заражения. Поэтому следует подождать три месяца с момента заражения, прежде чем идти проверяться, чтобы быть уверенным в том, что бактерия может быть обнаружена. Проверьтесь, если Вы подозреваете, что у Вас сифилис.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение от сифилиса бесплатно. Инфекцию лечат, как правило, при помощи инъекций пенициллина в течение от одной до трёх недель. Если Вы являетесь носителем бактерии, то Вашему половому партнёру также следует провериться. Если у Вас несколько партнёров, надо провериться всем.

ПРИ СИФИЛИСЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

Сифилисом можно заразиться повторно. Сифилисные язвы также могут проходить сами собой, и инфекция

может дремать в организме в течение долгих лет. Если инфекцию не лечить, она может повлечь за собой осложнения. Риск возникновения осложнений уменьшается, если лечение начинается незамедлительно.

Сифилис может вернуться, переходя в так называемую вторичную и третичную стадии инфекции. Симптомы тогда отличаются от первичной стадии. При сифилисе вторичной стадии у Вас могут, например, возникнуть шелушащиеся высыпания на теле, жар и выпадение волос. Вторичная стадия сифилиса возникает в срок от семи до десяти недель после того, как первое проявление болезни сходит на нет. Сифилис третичной стадии может причинить тяжёлые повреждения сердечно-сосудистой системе организма значительно позже. Кроме того, могут быть поражены кожа и слизистые оболочки, а также нервная система и мозг. Поражения кровеносных сосудов, нервной системы и мозга могут быть опасны для жизни, если Вам не будет оказано лечение.

Невылеченный сифилис может передаться ребёнку в ходе беременности и причинить ему серьёзные повреждения. В ходе беременности Вам как будущей маме должны предложить сдать тест на сифилис. Его цель – предоставить Вам лечение и защитить ребёнка от заболеваний.

Данные тексты составлены в 2009 г. Государственным управлением здравоохранения и социального обеспечения. Редакторы: Ханс Карлберг, главный врач SöSAM, Отделение сексуального здоровья кожно-венерологического диспансера при больнице SÖDERSJUKHUSET; Ханс Фредлунд, доцент и врач-эпидемиолог Университетской больницы в Örebro в областном управлении района (LÄN) Örebro; Лена Марионс, доцент и главный врач Женской клиники при Каролинской Университетской больнице (KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET).

Художественное оформление и иллюстрации: Infab AB

