

# Sífilis

¿Buscas información en otros idiomas? Visita [www.hivportalen.se](http://www.hivportalen.se)

La sífilis la causa una bacteria. La bacteria puede alojarse en la mucosa de los órganos genitales, pero también en el recto, la boca y la garganta. La bacteria puede hallarse también en heridas o erupciones de la piel causadas por la bacteria. La sífilis se contagia en los contactos sexuales sin protección y es transmitida fácilmente entre las personas al mantener coito vaginal y sexo anal y oral. La sífilis puede ser transmitida a través de la saliva. En ese caso las bacterias entran en las heridas o las lesiones de la mucosa bucal. También te puedes contagiar de sífilis a través de la sangre si utilizas drogas y compartes jeringuilla y aguja con algún portador de la bacteria.

## SÍNTOMAS DE LA SÍFILIS

La sífilis no provoca necesariamente síntomas. También puede pasar tiempo antes sentir molestia alguna. En caso de manifestarse síntomas, éstos aparecerán aproximadamente entre dos semanas y tres meses después del contagio. De ser así, podrás sufrir heridas en los genitales o en los puntos de penetración de la bacteria, por ejemplo, alrededor del ano o en la cavidad bucal. Las heridas no necesariamente duelen o escuecen. Los ganglios próximos a la herida a menudo se inflaman.

## HAZTE LA PRUEBA DE LA SÍFILIS

La prueba de sífilis es gratuita y se lleva a cabo mediante una muestra de sangre. También se pueden tomar muestras de la herida donde se sospecha que está presente la bacteria. La bacteria se puede detectar como muy pronto cuatro semanas después del contagio. Por ello deberás esperar tres meses después del contagio para efectuarte la prueba y así asegurarte de que pueda descubrirse la bacteria. Hazte la prueba si sospechas que tienes sífilis.

## TRATAMIENTO

El tratamiento contra la sífilis es gratuito. La infección es tratada generalmente con inyecciones de penicilina aplicadas durante un periodo de una a tres semanas. Tu pareja también deberá someterse a la prueba si eres portador de la bacteria. Si tienes varias parejas, todas ellas deberán hacerse la prueba.

## A TENER EN CUENTA CON LA SÍFILIS

Puedes padecer sífilis en repetidas ocasiones. Las heridas ocasionadas por la sífilis también pueden sanar por sí mismas y la infección mantenerse latente en el cuerpo durante muchos años. Asimismo, puedes sufrir enfermedades derivadas si no se trata la infección. El riesgo de enfermedades derivadas disminuye si recibes tratamiento rápidamente.

La sífilis puede reaparecer en lo que se denomina estadio infeccioso secundario y terciario. En esos casos, los síntomas se diferencian del primer estadio. La sífilis en su estadio secundario puede causarte erupciones con descamación en el cuerpo, fiebre y caída de pelo. La sífilis secundaria aparece de siete a diez semanas después de curarse el primer brote. La sífilis terciaria puede originar mucho tiempo después lesiones graves en el sistema cardiovascular del organismo. También pueden sufrir lesiones la piel y las mucosas, así como el sistema nervioso y el cerebro. Los daños vasculares, del sistema nervioso y del cerebro pueden resultar fatales si no recibes tratamiento.

La sífilis sin tratar puede transmitirse al feto durante el embarazo, causando al niño lesiones graves. Si vas a ser madre, te deberán ofrecer una prueba de sífilis durante el embarazo. El objetivo es poder proporcionarte tratamiento y proteger al niño de posibles lesiones.

---

El presente texto fue elaborado en 2009 por la Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social de Suecia, siendo su contenido examinado por HANS CARLBERG, médico jefe de la Unidad de Salud Sexual (Sösam) de la Clínica de Dermatología y Venereología del Södersjukhuset; HANS FREDLUND, profesor adjunto y médico especializado en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Örebro, perteneciente a la administración provincial de Örebro; LENA MARIONS, profesora adjunta y médico jefe de la Clínica de Ginecología del Hospital Universitario Karolinska.

---

Diseño gráfico e ilustración: Infab

