

โรคหนองใน/Gonorré

คุณค้นหาข้อมูลเป็นภาษาอื่นหรือเปล่า? ถ้าใช่ ก็เข้าไปที่: www.hivportalen.se

โรคหนองในเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งส่วนมากจะปรากฏอยู่ตามท่อปัสสาวะ เชื้อดังกล่าวอาจปรากฏอยู่ในบริเวณลำคอหรือในทวารหนักทั้งในผู้หญิงและผู้ชายได้ ในตัวผู้หญิง เชื้อดังกล่าวจะปรากฏอยู่ตามเยื่อบุช่องคลอด

โรคหนองในจะแพร่เชื้อเมื่อมีการร่วมเพศทางช่องคลอดและทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน แบคทีเรียยังสามารถที่จะถ่ายทอดได้ เมื่อมีการร่วมเพศทางปากโดยไม่ป้องกัน แม้จะไม่ใช่เรื่องธรรมดา โรคหนองในก็ยังสามารถถ่ายทอดสู่กันได้ เมื่อมีการช่วยกันสำเร็จความใคร่โดยที่มีการสัมผัสโดยตรงกับเยื่อเมือกที่ติดเชื้อ เพียงแค่นิ้วมือไปสัมผัสกับเยื่อบุช่องคลอดที่ติดเชื้อก็จะทำให้เยื่อบุช่องคลอดที่ปกติอยู่รับเชื้อมาได้ ถ้าผู้ใช้ของเล่นทางเพศร่วมกับคนอื่น คุณก็อาจติดโรคหนองในได้ด้วยเช่นกัน

อาการของโรคหนองใน

โรคหนองในถ่ายทอดได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องแสดงอาการใดๆ จากการที่ไม่มีอาการ คุณจึงสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอื่นของคุณได้ ตัวคุณเองเช่นเดียวกันก็สามารถติดโรคหนองในจากคนอื่นของคุณได้โดยที่คุณทั้งสองไม่รู้ตัว ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย อาจใช้เวลาตั้งแต่ 2 ถึง 7 วันหลังจากที่คุณได้รับเชื้อมา กว่าจะรู้สึกถึงอาการ อาการมักจะแสดงออกมาในรูปแบบเมือกขาวที่ไหลออกจากท่อปัสสาวะ และอาจรู้สึกปวดแสบเมื่อกถ่ายปัสสาวะ ถ้าเชื้อติดอยู่ที่ลำคอหรือที่ทวารหนัก อาการอาจจะน้อยกว่าหรือไม่ก็แทบที่จะไม่แสดงอาการเลย

ทดสอบหาโรคหนองใน

การตรวจตัวอย่างโรคหนองในนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การติดเชื้อพิสูจน์ได้โดยตรวจตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียจากท่อปัสสาวะ สำหรับผู้หญิงใช้วิธีตรวจตัวอย่างจากคอมดลูกด้วย ถ้าคุณได้มีการร่วมเพศทางปากหรือทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน ก็ควรที่นำตัวอย่างเชื้อจากลำคอและทวารหนักไปให้ตรวจด้วย

หากคุณสงสัยว่า คุณได้รับเชื้อโรคหนองในมาก็ควรไปทดสอบหา ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันถึงหนึ่งสัปดาห์หลังการติดเชื้อมาจนผลการตรวจจะแสดงให้เห็นว่า คุณเป็นโรคหนองในหรือไม่ ดังนั้น จึงอาจจะต้องรอสักสองสามวันหลังจากที่ได้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ก่อนไปทดสอบหา

การรักษา

การรักษาโรคหนองในไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และการติดเชื้อนั้นรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ จึงเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการรักษานั้น คุณต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ใด นอกจากนี้คุณยังจะต้องนำตัวอย่างมาให้ทดสอบหาเพิ่มเติมหลังจากสิ้นสุดการรักษาไปแล้ว เพื่อนำไปทดสอบหาว่าเชื้อแบคทีเรียได้หายไปหมดแล้ว ก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์อีก บางครั้งเชื้อโรคอาจจะดื้อยาและยากต่อการรักษา ในกรณีนั้น คุณต้องได้รับยาปฏิชีวนะประเภทอื่น คุณนอนของคุณเองก็จำเป็นต้องนำตัวอย่างมาตรวจด้วย ถ้าหากคุณมีคู่นอนหลายคน คู่นอนทุกคนก็ควรได้รับการตรวจและการรักษา เมื่อมีผลยืนยันว่ามี การติดเชื้อเกิดขึ้น

ข้อควรคิดเมื่อเป็นโรคหนองใน

คุณสามารถที่จะเป็นโรคหนองในได้หลายครั้ง คุณยังสามารถเป็นโรคแทรกซ้อนบางโรคได้อีกด้วย ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนจะลดลง ถ้าคุณเข้ารับการรักษาในที่ที่ ผู้หญิงสามารถเกิดอาการอักเสบที่ท่อเลี้ยงรังไข่ได้ ผู้ชายอาจเกิดอาการอักเสบที่ลูกอัณฑะ โรคหนองในที่ไม่ได้รับการรักษาอาจมีผลกระทบต่อโอกาสที่จะมีลูกเพราะอาจทำให้เป็นหมันได้ เชื้อแบคทีเรียยังสามารถเข้าไปในกระแสเลือดแล้วทำให้เกิดเลือดเป็นพิษได้

ข้อความเหล่านี้เรียบเรียงขึ้นในปี 2009 โดย Socialstyrelsen/Smittskyddsinstitutet และข้อความมีการตรวจทานโดย น.พ. อันส์ คาร์ลแบร์ย หัวหน้าแผนก SöSAM หน่วยงานเพื่อสุขภาพทางเพศ แห่งคลินิกสำหรับผิวหนังวิทยา และกามโรควิทยา โรงพยาบาลเซเดอร์; น.พ. อันส์ เฟรดลินด์ ร.ศ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อแห่งสภาปกครองประจำมณฑลเออเรบรู ณ มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลเออเรบรู; พ.ญ. เลียน่า มาริยอนส์ ร.ศ และหัวหน้าแผนกคลินิกสตรี ณ มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลคาโรลินสกา

ออกแบบกราฟิกและภาพประกอบ: Infab AB

